


Zell Euclim

TABLETTEN



Calcium phosphoricum D6, Magnesium phosphoricum D6, Kalium arsenicosum D12, Kalium bromatum D12, Cuprum arsenicosum D12, Natrium tetrachloroauratum D12

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- ▶ Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- ▶ Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- ▶ Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.
- ▶ Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Zell Euclim und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Zell Euclim beachten?
3. Wie ist Zell Euclim einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Zell Euclim aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Zell Euclim und wofür wird es angewendet?

Zell Euclim ist ein homöopathisches Arzneimittel, zusammengestellt nach den Erfahrungen in der Biochemie nach Dr. Schüßler.

Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den Anwendungen der Biochemie nach Dr. Schüßler ab. Dazu gehören Zyklusunregelmäßigkeiten und Wechseljahrbeschwerden wie z.B.:

- ▶ **Periodenkrämpfe**
- ▶ **Stimmungsschwankungen**
- ▶ **Nervosität, Schlafstörungen**
- ▶ **Hitzewallungen**

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf den Erfahrungen der Biochemie nach Dr. Schüßler.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen sollte eine klinisch belegte Therapie aufgrund einer ärztlichen Diagnose erfolgen.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Zell Euclim beachten?

Zell Euclim darf nicht eingenommen werden,

- ▶ wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Calcium phosphoricum, Magnesium phosphoricum, Kalium arsenicosum, Kalium bromatum, Cuprum arsenicosum, Natrium tetrachloroauratum oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Zell Euclim einnehmen. Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos. Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen. Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Kinder

Zell Euclim ist nicht zur Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren vorgesehen.

Einnahme von Zell Euclim zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Einnahme von Zell Euclim zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Zell Euclim kann bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zell Euclim ist nicht zur Einnahme für Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit vorgesehen.

Wenn Sie schwanger werden, beenden Sie die Einnahme von Zell Euclim.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Zell Euclim hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Zell Euclim enthält Lactose (Milchzucker)

Bitte nehmen Sie Zell Euclim erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

3. Wie ist Zell Euclim einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

- ▶ **Bei Zyklusunregelmäßigkeiten:**

Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren: Zweistündlich 4 Tabletten

jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

- ▶ **Bei Periodenkrämpfen:**

Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:

Akut: Alle 5 Minuten 1 Tablette

Zur Vorbeugung: Stündlich 2 Tabletten

jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

- ▶ **Bei Nervosität, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen:**

Weibliche Jugendliche ab 12 Jahren und weibliche Erwachsene ab 18 Jahren: Stündlich 2 Tabletten

jeweils hintereinander im Mund zergehen lassen

- ▶ **Bei akuten Hitzewallungen:**

weibliche Erwachsene ab 18 Jahren:


Alle 20 Minuten 1 Tablette

Zum Einnehmen:

Die Tabletten im Mund zergehen lassen.

Die Tabletten können bis unmittelbar vor dem Essen und ab 15 Minuten nach dem Essen eingenommen werden.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.



Wenn Sie eine größere Menge von Zell Euclim eingenommen haben, als Sie sollten:

Es wurden keine Fälle einer Überdosierung berichtet.

Wenn Sie die Einnahme von Zell Euclim vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind bei der Einnahme von Zell Euclim keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Meldungen des Verdachts auf Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen,
Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich;

Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: www.basg.gv.at.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Zell Euclim aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren.

Lactose übernimmt leicht Gerüche aus der Umgebung, daher sollen die Tabletten immer in der geschlossenen Dose und in geruchsneutralen Räumen aufbewahrt werden.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie trage damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Zell Euclim enthält

Die Wirkstoffe sind: 1 Tablette enthält:

Calcium phosphoricum D6 63 mg, Magnesium phosphoricum D6 50 mg, Kalium arsenicosum D12 37 mg, Kalium bromatum D12 25 mg, Cuprum arsenicosum D12 25 mg, Natrium tetrachloroauratum D12 50 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat, Calciumbehenat, Kartoffelstärke;

Wie Zell Euclim aussieht und Inhalt der Packung

Weißer runde Tabletten in Kunststoffbehältern (PP) mit Schraubkappe (PE) zu 100 und 250 g. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

Brucker Bundesstraße 25A, A-5700 Zell am See

Tel.-Nr.: 06542 55044-0, Fax-Nr.: 06545 200504

e-mail: office@adler-pharma.at

Z.Nr.: 335820

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2016.